

## מערך תרגול 11

201 – 88 תשע"ח סמסטר ב'

### תזכורת 1

א. העתקת ווינגרטון היא העתקה לינארית  $W_p : T_p \rightarrow T_p$  המיוצגת בבסיס  $\{x_1, x_2\}$  ע"י המטריצה  $(L^i_j)$ . העתקת ווינגרטון צמודה לעצמה לכן הערכים העצמיים שלה ממשיים. הם מסומנים  $k_1, k_2$  ונקראים העקמומיות הראשיות. מתקיים  $K = k_1 k_2$ .

ב. אם  $v \in T_p$  וקטור עצמי מנורמל המתאים לעקמומיות הראשית  $k$ , ו-  $\beta(s)$  גאודז המקיים  $\beta(0) = p$ ,  $\beta'(0) = v$  אז  $k_\beta(0) = |k|$ .

ג. עקמומיות ממוצעת  $H$  של משטח בנקודה היא

$$H = \frac{1}{2} \text{Tr}(W_p) = \frac{1}{2} L^i_i = \frac{1}{2} (k_1 + k_2)$$

ד. משטח נקרא מיינימלי אם  $H = 0$  בכל נקודה, כלומר  $k_1 + k_2 = 0$  בכל נקודה.

**תרגיל 1 (תיקון)** בסוף תרגול שעבר חישבנו את מקדמי התבנית היסודית הראשונה והשנייה של הטורוס  $x(\theta, \phi) = ((\cos \phi + 2) \cos \theta, (\cos \phi + 2) \sin \theta, \sin \phi)$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} (\cos \phi + 2)^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (L_{ij}) = \begin{pmatrix} -(\cos \phi + 2) \cos \phi & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

כעת נמצא את מקדמי העתקת ווינגרטון ואת עקמומיות גאוס.

### פתרון 1

$$\begin{aligned} L^i_j &= -g^{ik} L_{kj} \\ &= - \begin{pmatrix} (\cos \phi + 2)^{-2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -(\cos \phi + 2) \cos \phi & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\cos \phi}{\cos \phi + 2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$K(\theta, \phi) = \det(L^i_j) = \frac{\cos \phi}{\cos \phi + 2}$$

נשים לב למשמעות הגאומטרית: עקמומיות גאוס 0 כאשר  $\phi = \frac{\pi}{2}$  ו-  $\phi = \frac{3\pi}{2}$ , עקמומיות גאוס חיובית כאשר  $\frac{\pi}{2} < \phi < \frac{3\pi}{2}$ , ועקמומיות גאוס שלילית כאשר  $\frac{3\pi}{2} < \phi < \frac{5\pi}{2}$ .

## תרגיל 2

א. חשבו את העקמומיות הראשיות  $k_1, k_2$ , את עקמומיות גאוס  $K$  ואת העקמומיות הממוצעת  $H$  עבור מישור.

ב. כנ"ל, עבור חרוט.

ג. כנ"ל, עבור הגרף של הפונקציה  $f(x, y) = xy$  בנקודה הקריטית  $(0, 0, 0)$ .

## פתרון 2

א. ראינו כי עבור מישור

$$(L^i_j) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$k_1 = k_2 = K = H = 0$$

ב. ראינו כי עבור החרוט  $x(u^1, u^2) = (u^2 \cos u^1, u^2 \sin u^1, u^2)$  מקדמי העתקת ווינגרטן הם

$$(L^i_j) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2u^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2}}{2u^2}, k_2 = 0, K = 0, H = \frac{\sqrt{2}}{4u^2}$$

ג.

$$H_f = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר בגלל ש-  $(0, 0, 0)$  נקודה קריטית של  $f(x, y)$  מתקיים שבנקודה זו

$$(L^i_j) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

הערכים העצמיים הם  $k_{1,2} = \pm 1$ , כלומר

$$K = k_1 k_2 = -1$$

$$H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = 0$$

**תרגיל 3** נסתכל על משטח הסיבוב המתקבל ע"י סיבוב של הפרבולה  $x = z^2 + \frac{1}{4}$  מסביב לציר  $z$ .

א. מציאו את התבנית היסודית הראשונה.

ב. מציאו את התבנית היסודית השנייה.

ג. מציאו את מקדמי העתקת ווינגרטון  $(L^i_j)$ .

ד. מציאו את עקמומיות גאוס  $K$  ואת עקמומיות ממוצעת  $H$ .

### פתרון 3

א. משטח סיבוב של  $(r(\phi), 0, z(\phi)) = (\phi^2 + \frac{1}{4}, 0, \phi)$

$$x(\theta, \phi) = \left( \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right) \cos \theta, \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right) \sin \theta, \phi \right)$$

מטריקה

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} r^2(\phi) & 0 \\ 0 & \left( \frac{dr}{d\phi} \right)^2 + \left( \frac{dz}{d\phi} \right)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\phi^2 + \frac{1}{4})^2 & 0 \\ 0 & 4\phi^2 + 1 \end{pmatrix}$$

ב.

$$\begin{cases} x_1 = (-\sin \theta (\phi^2 + \frac{1}{4}), \cos \theta (\phi^2 + \frac{1}{4}), 0) \\ x_2 = (2\phi \cos \theta, 2\phi \sin \theta, 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{11} = (-\cos \theta (\phi^2 + \frac{1}{4}), -\sin \theta (\phi^2 + \frac{1}{4}), 0) \\ x_{12} = (-2\phi \sin \theta, 2\phi \cos \theta, 0) \\ x_{22} = (2 \cos \theta, 2 \sin \theta, 0) \end{cases}$$

כעת,

$$x_1 \times x_2 = \left( \cos \theta \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right), \sin \theta \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right), -2\phi \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right) \right)$$

וקטור זה מקביל ל-  $(\cos \theta, \sin \theta, -2\phi)$  לכן הנורמל הוא

$$n = (1 + 4\phi^2)^{-\frac{1}{2}} (\cos \theta, \sin \theta, -2\phi)$$

כלומר

$$(L_{ij}) = \begin{pmatrix} \langle x_{11}, n \rangle & \langle x_{12}, n \rangle \\ \langle x_{12}, n \rangle & \langle x_{22}, n \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} (\phi^2 + \frac{1}{4})^{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & (\phi^2 + \frac{1}{4})^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix}$$

ג. כזכור  $L^i_j = -g^{ik} L_{kj}$  אצלנו

$$\begin{aligned}(L^i_j) &= - \begin{pmatrix} (\phi^2 + \frac{1}{4})^{-2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} (\phi^2 + \frac{1}{4})^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} (\phi^2 + \frac{1}{4})^{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & (\phi^2 + \frac{1}{4})^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} (\phi^2 + \frac{1}{4})^{\frac{-3}{2}} & 0 \\ 0 & \frac{-1}{4} (\phi^2 + \frac{1}{4})^{\frac{-3}{2}} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

ד.

$$\begin{aligned}K &= \left( \frac{1}{2} \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right)^{\frac{-3}{2}} \right) \left( \frac{-1}{4} \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right)^{\frac{-3}{2}} \right) = \frac{-1}{8} \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right)^{-3} \\ H &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right)^{\frac{-3}{2}} - \frac{1}{4} \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right)^{\frac{-3}{2}} \right) = \frac{1}{8} \left( \phi^2 + \frac{1}{4} \right)^{\frac{-3}{2}}\end{aligned}$$

## תזכורת 2

א. נאמר שהפרמטריזציה  $x(u^1, u^2)$  היא בקואורדינטות איזותרמיות אם יש פונקציה  $f$  כך ש-  
 $(g_{ij}) = f^2(\delta_{ij}) > 0$  במילים אחרות, המטריקה שקולה קונפורמית למטריקה שטוחה  
סטנדרטית עם גורם קונפורמי  $f^2$ .

ב. תהי  $f(u^1, u^2) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  הפלסיאן של  $f$  הוא

הוא

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{(\partial u^1)^2} + \frac{\partial^2 f}{(\partial u^2)^2} = f_{11} + f_{22}$$

ג. משטח  $x(u^1, u^2) = (x^1(u^1, u^2), x^2(u^1, u^2), x^3(u^1, u^2))$  הנתון בקואורדינטות איזותרמיות  
הוא מיינמלי אם ורק אם  $\Delta x = (\Delta x^1, \Delta x^2, \Delta x^3) = 0$ , כלומר,

$$x_{11} + x_{22} = \vec{0}$$

**תרגיל 4** יהי  $a \neq 0$ . הוכיחו שהמשטח הנתון ע"י

$$x(u, v) = (a \sinh v \cos u, a \sinh v \sin u, au)$$

הוא משטח מיינמלי.

#### פתרון 4

$$\begin{cases} x_1 = (-a \sinh v \sin u, a \sinh v \cos u, a) \\ x_2 = (a \cosh v \cos u, a \cosh v \sin u, 0) \end{cases}$$

מקדמי המטריקה

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} a^2(\sinh^2 v + 1) & 0 \\ 0 & a^2 \cosh^2 v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 \cosh^2 v & 0 \\ 0 & a^2 \cosh^2 v \end{pmatrix}$$

כלומר הקואורדינטות איזותרמיות. לכן, המשטח מיינימלי אמ"מ  $\vec{0} = x_{11} + x_{22} = \Delta x$ . אכן,

$$\begin{cases} x_{11} = (\cos \theta \cosh \phi, \sin \theta \cosh \phi, 0) \\ x_{22} = (\cosh \phi \cos \theta, \cosh \phi \sin \theta, 0) \end{cases}$$

כלומר  $x_{11} + x_{22} = \vec{0}$ , לכן המשטח מיינימלי, כדרוש.

**תזכורת 3** יש לנו את הנוסחאות הבאות עבור עקמומיות גאוס  $K$ :

$$\begin{aligned} K &= \det(L^i_j) \\ &= L^1_{[1} L^2_{2]} \\ &= \frac{\det(L_{ij})}{\det(g_{ij})} \\ &= -\frac{2}{g_{11}} L^1_{[1} L^2_{2]} \\ &= \frac{2}{g_{11}} \left( \Gamma^2_{1[1,2]} + \Gamma^j_{1[1} \Gamma^2_{2]j} \right) \end{aligned}$$

בפרט הנוסחא האחרונה מראה שניתן לחשב את עקמומיות גאוס רק ממקדמי  $g_{ij}$ . זהו ה-  
*Theorema Egregium*.

**תרגיל 5** בקואורדינטות  $(u^1, u^2) = (x, y)$  נתון משטח בעל המטריקה

$$(g_{ij}(x, y)) = \begin{pmatrix} y & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$$

עבור  $y > 0$ . מציאו את עקמומיות גאוס.

**פתרון 5** ראשית נמצא את סמלי גמא. גורם קונפורמי  $\lambda(x, y) = y$ , נגזרותיו  $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$ . לכן

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{\lambda_1}{2\lambda} = 0 \\ \Gamma_{22}^1 &= \frac{-\lambda_1}{2\lambda} = 0 \\ \Gamma_{12}^1 &= \frac{\lambda_2}{2\lambda} = \frac{1}{2y} \\ \Gamma_{11}^2 &= \frac{-\lambda_2}{2\lambda} = \frac{-1}{2y} \\ \Gamma_{22}^2 &= \frac{\lambda_2}{2\lambda} = \frac{1}{2y} \\ \Gamma_{12}^2 &= \frac{\lambda_1}{2\lambda} = 0\end{aligned}$$

כעת,

$$\begin{aligned}K &= \frac{2}{g_{11}} \left( \Gamma_{1[1,2]}^2 + \Gamma_{1[1]}^j \Gamma_{2]j}^2 \right) \\ &= \frac{2}{g_{11}} \left( \Gamma_{1[1,2]}^2 + \Gamma_{1[1]}^1 \Gamma_{2]1}^2 + \Gamma_{1[1]}^2 \Gamma_{2]2}^2 \right) \\ &= \frac{1}{g_{11}} \left( \Gamma_{11,2}^2 - \Gamma_{12,1}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{21}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 \right) \\ &= \frac{1}{y} \left( \frac{1}{2y^2} - 0 + 0 - \left( \frac{1}{2y} \right) \left( \frac{-1}{2y} \right) + \left( \frac{-1}{2y} \right) \left( \frac{1}{2y} \right) - 0 \right) \\ &= \frac{1}{2y^3}\end{aligned}$$

**תרגיל 6** לבטא ע"י המקדמים  $g_{ij}, L_{ij}, L_j^i, \Gamma_{ij}^k$  ולפשט ככל הניתן:

א.  $\langle x_{ij}, n_k \rangle \delta_m^k g^{ml}$

ב.  $\langle n_i, n_j \rangle$

**פתרון 6**

א. סכימה  $k, m$ , חפשיים  $j, i, \ell$ .

$$\begin{aligned}
 \langle x_{ij}, n_k \rangle \delta_m^k g^{m\ell} &= \langle x_{ij}, n_k \rangle g^{k\ell} \\
 &= \langle \Gamma_{ij}^a x_a + L_{ij} n, n_k \rangle g^{k\ell} \\
 &= \left( \Gamma_{ij}^a \overbrace{\langle x_a, n_k \rangle}^{L_{ak}} + L_{ij} \overbrace{\langle n, n_k \rangle}^0 \right) g^{k\ell} \\
 &= \Gamma_{ij}^a L_{ak} g^{k\ell} \\
 &= \Gamma_{ij}^a (g^{\ell k} L_{ka}) \\
 &= -\Gamma_{ij}^a L_a^\ell
 \end{aligned}$$

ב.

$$\begin{aligned}
 \langle n_i, n_j \rangle &= \langle L_i^k x_k, L_j^\ell x_\ell \rangle \\
 &= L_i^k L_j^\ell \langle x_k, x_\ell \rangle \\
 &= L_i^k L_j^\ell g_{k\ell} \\
 &= L_i^k (g_{k\ell} L_j^\ell) \\
 &= -L_i^k L_{kj}
 \end{aligned}$$

**תרגיל 7** הוכיחו שהביטוי  $\frac{\partial}{\partial u^k} (\Gamma_{ij}^\ell x_\ell + L_{ij} n)$  הוא סימטרי באינדקסים  $j$  ו- $k$ .

**פתרון 7**  $\Gamma_{ij}^\ell x_\ell + L_{ij} n = x_{ij}$ , כלומר צריך להראות ש- $x_{ijk}$  סימטרי באינדקסים  $j, k$ .

אך זה ידוע לפי שוויון נגזרות מעורבות (משפט קליר) כי

$$x_{ijk} = (x_i)_{jk} = (x_i)_{kj}$$